


Retour de beau temps pour le week-end :

....Etat des Lieux :



Le point Météo :

- Un temps variable ce jeudi : éclaircies / passages nuageux, avec des averses plus présentes l'après-midi. Un vent toujours modéré de Sud-Ouest, plus faible le soir. T° mini : 5-7°C – t° maxi 14-15°C.
- Vendredi : après la grisaille du matin, un temps ensoleillé revient l'après-midi. Un vent toujours faible à modéré de Sud /Sud-Ouest - T° mini : 4-6°C – t° maxi 18-20°C.
- Samedi et Dimanche : Ensoleillé, calme, et très doux. Un vent Faible de Sud-Est. T° mini : 8-10°C samedi, 12-13°C dimanche. T° maxi : 21-23°C samedi, 23-25°C dimanche.
- Lundi et Mardi : Retour de la pluie !: un temps souvent nuageux avec le retour des averses, surtout lundi. Un vent faible, variable. T° mini : 11-13°C – t° maxi : 20-22°C.

● BLE TENDRE :

● Stade :

« Dernière feuille pointante » à « dernière feuille déployée » sont dans une majorité de situations les stades observés.

● Maladies :

⇒ Etat des Lieux :

Les orages de ce début de semaine avec des ondées parfois fortes auront été favorables aux maladies, notamment à la Septoriose.

⇒ Que faire ? :

**-Si à ce jour aucune protection du feuillage n'a été réalisée,
-ou si votre dernière intervention date de plus de 10 jours :**

⇒ Intervenez avec une spécialité du type *OPUS, OPERA, INPUT PACK, MADISON PACK, BELL, JOAO, CITADELLE...*

-Attention néanmoins dans les situations où vous observez de la Rouille Jaune (signalée dans 2 lieux la semaine dernière ET cette semaine à Villentrois sur Autan, et à Levroux sur Aldric)

⇒ Alors utilisez une *TRIAZOLE*, OU une association *TRIAZOLE +STROBILURINE*.

● Désherbage :

⇒ Attention ! :

-A partir de 2 nœuds,

les hormones ne peuvent plus être utilisées, hormis STARANE 200, KART et ALLIE, qui sont possibles jusqu'au gonflement.

-Attention aux délais avant récolte :

Le délai avant récolte du KART est de 70 jours.

● Troisième apport d'AZOTE sur BLE :

● Quand ? :

A partir de maintenant, et jusqu'au « gonflement » :

Vu le contexte de la valorisation respective des quintaux et de la protéine, ne pas attendre « Gaine éclatée ».

Il faut cependant un ressuyage minimum pour que le blé utilise l'azote.

● Premiers échos des mesures JUBIL et N-TESTER :

-Mesures N-Tester :

Les mesures N-TESTER conseillent en moyenne d'apporter 20 unités de plus que la dose SCAN ou bilan.

-Mesures Jubil :

Réalisées à la même date, les mesures JUBIL conseillent des doses rapportées un peu plus faibles que le N-Tester.

● Attention à l'excès d'eau...

Compte tenu de l'excès d'eau, l'utilisation de l'azote est actuellement mauvaise dans *les sols à ressuyage lent, ou dans les parcelles mal implantées.*

● ...Refaire ses calculs :

-Tenez compte de l'hydromorphie et du rendement espéré pour savoir comment moduler le troisième apport.

-Refaites vos calculs de dose totale en réévaluant les rendements (*à la hausse ou à la baisse*) en fonction de l'état de la parcelle, et en ajustant la pluviométrie (cf message précédent « *IM'MEDIA Cultures – n°25 – 24 04 08 – SCAN – Azote* ») :

☞ *Si le potentiel est limité (sol hydromorphe, ou culture mal implantée), tenez-vous en à la dose prévisionnelle.*

NB : si un troisième apport a déjà été réalisé, ne prenez plus en compte les contrôles en végétation.

● ORGE D'HIVER :

● Stade :

C'est « *la sortie des barbes* » voire « *l'épiaison* ».

● Maladies et régulateur :

-Attention, « sortie des Barbes » = stade limite !

A « *la sortie des barbes* », il est encore possible d'appliquer votre fongicide ou votre régulateur mais à « *l'épiaison* », *c'est trop tard...*

Dans une majorité de situations ces interventions devraient donc désormais être réalisées.

● BLE DUR d'HIVER :

● Maladies : *c'est plutôt calme...*

-La septoriose est discrète et tant que vous n'observez pas de rouille, le traitement peut être retardé.

-Attendre la « *sortie de la dernière feuille* » pour réaliser une intervention avec un produit efficace sur rouille brune (Opus 0,5L/ha).

● COLZA :

● Stade :

« Défloraison » nettement amorcée, notamment en Boischaut,
« Début défloraison » pour les situations les plus tardives observées en Champagne.

● Pucerons Cendrés:

Ils sont signalés. Allez voir régulièrement leur évolution.

↳ Une intervention se justifie lorsque l'on constate plus de 2 colonies / m², pas seulement sur les bordures, mais également au milieu de la parcelle.

Le seuil a été atteint à Martizay

↳ Si vous devez intervenir :

Utilisez un insecticide du type KARATE K 1L/ha, TALSTAR FLO 0,1L/ ha

● Charançons des Siliques :

Ils sont toujours présents, mais le seuil d'intervention (1 charançon pour 2 plantes) est rarement atteint.

↳ A savoir : Dès que l'on observe plus de 10 siliques bosselées, ce ravageur n'est plus un risque majeur.

● Sclérotinia :

Compte tenu du stade des cultures (> à « G1 » dans une majorité de parcelles), à ce jour l'intervention devrait avoir été réalisée.

-Pour les très rares situations protégées la première semaine d'Avril,

une ré intervention avec une Triazole pourrait éventuellement être envisagée pour protéger les hampes secondaires qui défleurissent en ce moment.

● ORGE DE PRINTEMPS :

● Maladies Foliaires :

↳ Compte tenu des conditions climatiques actuelles, il est nécessaire d'effectuer un suivi de vos parcelles : La semaine dernière des taches de Rhynchosporiose étaient visibles sur certaines variétés.

● Herbicides :

↳ L'utilisation de spécialités à base d'hormones pour détruire les dicotylédones est possible.

● POIS D'HIVER :

● Stade :

« Premières fleurs » pour Isard

● Anthracnose :

L'Anthracnose est toujours d'actualité.

-Si vous observez des symptômes sur feuilles :
intervenir avec 1000g de Chlorothalonil.

-Si vous êtes intervenu il y a moins de 15 jours :

pas d'intervention pour le moment.

Mais à suivre de près compte tenu de la pluie de ces derniers jours...

Pour tout renseignement complémentaire...



...N'hésitez-pas à demander à votre Technicien de Chambre d'Agriculture !:

(tel service Agronomie : 02.54.61.61.45.)